.Версия альтернативной Стандартной модели.

В первом столбце которой три поколения квадриг кварков, вместе с их антикварками. Также обозначена, большими буквами, ещё не открытая четвёртая квадрига кварков, которая, согласно симметрии, должна быть.

Во втором столбце -- две квадриги предполагаемых гравитонов, а ниже, две квадриги, существующих глюонов

В третьем столбце -- три поколения квадриг лептонов с их визави. Также обозначена ещё не открытая -- четвёртая квадрига лептонов, которая, согласно симметрии, должна быть.

В четвёртом столбце, автор на квадригу разбил бозон -- фотон, на положительную и отрицательную полуволны, на противоположные магнитные полуволны. Также можно представить: Хиггса; Слабое взаимодействие; И ту недостающую квадригу, что "просится", на основании симметрии, в альтернативу, Стандартную модель.

Предположим, что одна из двух квадриг гравитонов и одна из двух квадриг глюонов, являются "соединительными тканями" между тёмной энергией и тёмной материей материей с нашими энергиями и материями.

КВАРКИ		ГРАВИТОНЫ		ЛЕПТОНЫ		БОЗОНЫ		
u	d	G_1	G_2	e^-	ν_e	$-$	Y_γ	фотон
$\tilde{u}$	$\tilde{d}$	G_3	G_4	e^+	$\tilde{\nu}_e$	$+$	S_γ	
s	c	G_5	G_6	μ^-	ν_μ	H^-	Y_{H^0}	Хиггс
$\tilde{s}$	$\tilde{c}$	G_7	G_8	μ^+	$\tilde{\nu}_\mu$	H^+	S_{H^0}	
t	b	g_1	g_2	τ^-	ν_τ	W^-	Y_{Z^0}	Слабое взаимодействие
$\tilde{t}$	$\tilde{b}$	g_3	g_4	τ^+	$\tilde{\nu}_\tau$	W^+	S_{Z^0}	
A	B	g_5	g_6	σ^-	ν_σ	X^-	Y_{X^0}	Бозон, который простой
$\tilde{A}$	$\tilde{B}$	g_7	g_8	σ^+	$\tilde{\nu}_\sigma$	X^-	S_{X^0}	